

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ


2020 թվականին << Առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվել է Երևան քաղաքի դեղատների աշխատողների շրջանում հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության վերաբերյալ գիտելիքների և գործնականում դրանց կիրառման գնահատման հետազոտություն: Ծրագիրն իրականացվել է Տրոպիկական հիվանդությունների գիտական հետազոտությունների և մասնագետների վերապատրաստման հատուկ ծրագրի (TDR, the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases) ֆինանսական աջակցությամբ, որի հովանավորներն են՝ UNICEF, UNDP, the World Bank և WHO: Հետազոտության արդյունքում պարզվել է հետևյալը.

Հարցվել է 289 աշխատող: Հարցվողների միջին տարիքը կազմել է 30.5 ± 0.5 տարի: Հարցվողների 94%-ը եղել են իգական սեռի ներկայացուցիչները:

Ա. Ընդհանուր հարցեր.


Հարցվողների մեծամասնությունն ուներ միջին դեղագործական (45.3%) և միջին բժշկական (24.2%) կրթություն (Գծապատկեր 1):

Գծապատկեր 1. Հարցվողների բաշխումն ըստ կրթության.




Հարցվողների մեծամասնությունն (58%) ուներ 4-5 տարվա մասնագիտական փորձ (Գծապատկեր 2):

Գծապատկեր 2. Հարցվողների բաշխումն ըստ մասնագիտական փորձի.



Հարցվողների 7%-ը վերջին մասնագիտական վերապատրաստումն անցել էր 5 տարուց ավել առաջ, իսկ հարցվողների 21%-ն ընդհանրապես չունեին վերապատրաստում (Գծապատկեր 3):

Գծապատկեր 3. Վերջին մասնագիտական վերապատրաստումը.



Բ. Գիտելիքների գնահատման հարցերին ստացվել են հետևյալ պատասխաններ (որոշ հարցեր կարող են ունենալ մի քանի ճիշտ պատասխան).

Աղյուսակ 1.

1. Հակաբիոտիկներն ունեն նոյն ազդեցությունները, ինչպիսիքն ունեն հակաբորբոքային դեղերը՝		
□ այո	123	42.6%
□ ոչ	141	48.8%
□ չգիտեմ	25	8.7%
2. Հակաբիոտիկներն ազդում են հետևյալ պաթոգենների վրա.		
□ բակտերիաներ	282	97.6%
□ վիրուսներ	39	13.5%
□ սնկեր	33	11.4%
□ նախակենդանիներ	25	8.7%
□ մակաբույծներ	10	3.5%
□ նշվածներից ոչ մեկի վրա	0	0.0%
□ դժվարանում եմ պատասխանել	6	2.1%
3. Բացի մարդուց, ու՞մ օրգանիզմում նոյնպես կարող է ձևավորվել հակամանրէային կայունություն		
□ լարորատոր առնետներ/կենդանիներ	200	69.2%
□ Վայրի կենդանիներ	32	11.1%
□ ֆերմային կենդանիներ	105	36.3%
□ ձկներ, ռեպտիլիաներ, սառնարյուն կենդանիներ	29	10.0%
□ ոչ մեկում	0	0.0%
□ դժվարանում եմ պատասխանել	49	17.0%
4. Հակամանրէային դեղերի ոչ ճիշտ օգտագործման հետևանքով կարող է/են զարգանալ		
□ լուրջ կողմնակի ազդեցություն (էֆեկտներ)	190	65.7%
□ պաթոգեն մանրէների աճի կանգ	19	6.6%
□ հակամանրէային կայունություն	166	57.4%
□ բուժման արժեքի բարձրացում	23	8.0%
□ դժվարանում եմ պատասխանել	26	9.0%
5. Հակաբիոտիկների օգտագործումն արդյունավետ է հետևյալ դեպքերում՝		
□ սեղոնային գրիպ	16	5.5%
□ միզուլիների վարակներ	258	89.3%
□ մաշկային վարակներ	189	65.4%
□ ականջների վարակներ	193	66.8%
□ դժվարանում եմ պատասխանել	20	6.9%
6. Ո՞րն է հակաբիոտիկների հիմնական թերությունը, որի վերացման վրա աշխատում են հետազոտողները՝		
□ հակաբիոտիկները չեն ազդում վիրուսների վրա	103	35.6%
□ հակաբիոտիկներն ունեն կողմնակի էֆեկտներ	126	43.6%
□ երկարատև կիրառումը կարող է դառնալ հակամանրէային կայունության պատճառ	164	56.7%
□ չեն տարրերակում օգտակար և վնասակար բակտերիաները:	80	27.7%
□ դժվարանում եմ պատասխանել	22	7.6%
7. Ձեր կարծիքով՝ ո՞ր դեպքերում կարող է զարգանալ հակամանրէային կայունություն.		
□ հակաբիոտիկների ընդունման ժամանակ բժշկի նշանակումները չկատարելու դեպքում	186	64.4%

<input type="checkbox"/> պացիենտը գնում է հակաբիոտիկներ առանց դեղատոմսի	99	34.3%
<input type="checkbox"/> պացիենտը չի ընդունում ոչ մի հակաբիոտիկ	7	2.4%
<input type="checkbox"/> պացիենտը գնում է նախընտրած հակաբիոտիկը	120	41.5%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	17	5.9%
8. Ձեր կարծիքով՝ ո՞ր պնդումն է ճիշտ՝		
<input type="checkbox"/> Եթե մրսածովյունը տևում է 4 օրից ավել, ապա հակաբիոտիկի օգտագործումը կարող է օգնել ավելի շուտ վերադառնալ աշխատանքի	92	31.8%
<input type="checkbox"/> Մրսածովյան պատճառը վիրուսներն են, իետևաբար այն հակաբիոտիկներով չի բուժվում	161	55.7%
<input type="checkbox"/> Կարելի է խնայել գոմար՝ կիրառելով նախկինում գնած հակաբիոտիկներ	1	0.3%
<input type="checkbox"/> ազդեցության լայն սպեկտրով հակաբիոտիկներ կիրառելով կարելի է կանխել բարձր ջերովյունն ու քրոտնարտադրովյունը	54	18.7%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	22	7.6%
9. Երբ հիվանդովյան ախտանշանները վերանում են, հակամանրէային դեղերի ընդունումը պետք է անմիջապես դադարեցվի՝		
<input type="checkbox"/> այո	76	26.3%
<input type="checkbox"/> ոչ	196	67.8%
<input type="checkbox"/> չգիտեմ	17	5.9%
10. Որքան հաճախ մարդիկ օգտագործեն հակաբիոտիկներ, այնքան դժվար կինի հետագայում բուժել մանրէային վարակները՝		
<input type="checkbox"/> այո	237	82.0%
<input type="checkbox"/> ոչ	10	3.5%
<input type="checkbox"/> չգիտեմ	42	14.5%
11. Հակաբիոտիկները		
<input type="checkbox"/> արդյունավետ են նոր սկսվող մրսածովյան ժամանակ (հազ, հարբուխ)	15	5.2%
<input type="checkbox"/> արդյունավետ են կոկորդի ցավի ժամանակ	47	16.3%
<input type="checkbox"/> կարող են վերացնել մրսածովյան ախտանշանները	21	7.3%
<input type="checkbox"/> թվարկած պատասխանները միսալ են	190	65.7%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	24	8.3%
12. Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունությունը կարող է դառնալ մահվան պատճառ՝		
<input type="checkbox"/> այո	136	47.1%
<input type="checkbox"/> ոչ	85	29.4%
<input type="checkbox"/> չգիտեմ	68	23.5%
13. Ո՞ր հակամանրէային դեղերի նկատմամբ է զարգանում կայունություն.		
<input type="checkbox"/> հակաբիոտիկներ	272	94.1%
<input type="checkbox"/> հակավիրուսային	19	6.6%
<input type="checkbox"/> հակասնկային	22	7.6%
<input type="checkbox"/> հակապարազիտար	9	3.1%
<input type="checkbox"/> ոչ մեկում	1	0.3%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	12	4.2%

Այսուակ 1-ից երևում է, որ հարցվողներն ունեն բավական գիտելիքներ հակամանրէային դեղերի վերաբերյալ միայն 34-82% դեպքերում: Հատկապես, եթե խոսքը գնում է հակաբիոտիկների մասին: Իսկ հակավիրուսային, հակասնկային և հակամակաբուժային դեղերի վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը չի գերազանցում 7.6%-ը: Մասնավորապես.

Հարցվողների կեսից ավելին չի տարբերակում հակամանրէային և հակաբորբոքային դեղերի ազդեցության մեխանիզմները:

13.5%-ը սխալմամբ կարծում են, թե հակաբիոտիկներն արդյունավետ են վիրուսների, 11.4%-ը՝ սնկերի, իսկ 3.5%-ը՝ մակաբույծների նկատմամբ:

30.8%-ը չգիտեն, որ հակամանրէային դեղերը կարող են կայունություն առաջացնել ոչ միայն լարորատոր կենդանիների, այլ նաև ֆերմային կենդանիների, ձկների և այլ օրգանիզմների մոտ:

Հակամանրէային դեղերի ոչ ճիշտ օգտագործման հետևանքով հակամանրէային կայունություն զարգացման մասին տեղյակ են հարցվողների միայն 57%-ը:

5.5%-ը սխալմամբ կարծում են, թե հակաբիոտիկներն արդյունավետ են սեղոնային գրիպի ժամանակ:

Հարցվողների միայն 1/3-ն է տեղյակ հակամանրէային կայունության զարգացման բոլոր մեխանիզմներից:

Հարցվողների ¼-ը ենթադրում են, որ ախտանշանների անհայտանալուց անմիջապես հետո կարելի է դադարեցնել հակամանրէային դեղերի ընդունումը՝ մոռանալով հակամանրէային կայունության զարգացման հնարավորին հետևանքի մասին:

Հարցվողների 1/2-ը տեղյակ չեն, որ հակամանրէային կայունությունը կարող է դառնալ մահվան պատճառ:

Այն փաստի մասին որ հակաբիոտիկների նկատմամբ կարող է զարգանալ կայունություն, տեղյակ է հարցվողների 94%-ը, իսկ հակավիրուսային, հակասնկային և հակապարագիտար դեղերի նկատմամբ՝ միայն 3-7%-ը:

Գ. Վերաբերմունքի գնահատման հարցերին ստացվել են հետևյալ պատասխաններ (որոշ հարցեր կարող են ունենալ մի քանի ճիշտ պատասխան)։

Աղյուսակ 2.

1. Ինչպես եք կարծում՝ հակամանրէային դեղերի ավելորդ կիրառումը լու՞րջ խնդիր է Հայաստանի համար՝		
<input type="checkbox"/> այո	219	75.8%
<input type="checkbox"/> ոչ	12	4.2%
<input type="checkbox"/> չգիտեմ	58	20.1%
2. Արդյոք ինքներդ նախընտրում եք օգտագործել հակաբիոտիկներ, եթե ունեք.		
<input type="checkbox"/> կոկորդի ցավ	47	16.3%
<input type="checkbox"/> հազ	33	11.4%
<input type="checkbox"/> հարբուխ	7	2.4%

<input type="checkbox"/> նոր սկսվող մրսածություն	9	3.1%
<input type="checkbox"/> ջերմություն	38	13.1%
<input type="checkbox"/> լուծ	22	7.6%
<input type="checkbox"/> նախընտրում եմ չօգտագործել	197	68.2%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	12	4.2%
3. Ձեր կարծիքով, արդյո՞ք հակամանրէային դեղերն անհրաժեշտ է վաճառել միայն դեղատոմսով՝		
<input type="checkbox"/> այո	106	36.7%
<input type="checkbox"/> ոչ բոլորը	151	52.2%
<input type="checkbox"/> ընդհանրապես ոչ	8	2.8%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	24	8.3%
4. Ձեր կարծիքով, հակամանրէային դեղերի որ տեսակները պետք է վաճառվեն միայն դեղատոմսով՝		
<input type="checkbox"/> հակաբիոտիկներ	228	78.9%
<input type="checkbox"/> հակավիրուսային	37	12.8%
<input type="checkbox"/> հակասնկային	60	20.8%
<input type="checkbox"/> հակամակարուծային	35	12.1%
<input type="checkbox"/> բոլոր տեսակներն ել պետք է վաճառվեն միայն դեղատոմսով	7	2.4%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	45	15.6%
5. Ձեր կարծիքով, հակամանրէային դեղերի որ դեղաձևերը պետք է վաճառվեն միայն դեղատոմսով՝		
<input type="checkbox"/> Ներարկման համար (սրվակներ)	240	83.0%
<input type="checkbox"/> Ներքին ընդունման (հարեր և օշարակներ («սրոոր»))	119	41.2%
<input type="checkbox"/> արտաքին օգտագործման (քսուկներ և կրեմներ)	1	0.3%
<input type="checkbox"/> սփրեյներ	26	9.0%
<input type="checkbox"/> աչքի, ականջի կաթիլներ	80	27.7%
<input type="checkbox"/> այլ դեղաձևեր՝ _____	7	2.4%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	42	14.5%
6. Արդյոք կարծում եք թե զիտեք, թե երբ պետք է կիրառել հակամանրէային դեղերը.		
<input type="checkbox"/> միանշանակ այո	10	3.5%
<input type="checkbox"/> հավանաբար այն	17	5.9%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	36	12.5%
<input type="checkbox"/> հավանաբար ոչ	158	54.7%
<input type="checkbox"/> միանշանակ ոչ	68	23.5%
7. Դուք ինքներդ մինչև վերջ ընդունում եք հակաբիոտիկի ամբողջ նշանակված կուրսը, եթե անզամ արդեն ավելի լավ եք Ձեզ զգում		
<input type="checkbox"/> միշտ	7	2.4%
<input type="checkbox"/> մեծամասամբ	85	29.4%
<input type="checkbox"/> հաճախ	20	6.9%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	5	1.7%
<input type="checkbox"/> երբեմն	19	6.6%
<input type="checkbox"/> երբեք	153	52.9%
8. Նախընտրո՞ւմ եք արդյոք տանը միշտ ունենալ հակամանրէային դեղեր, մտածելով, որ դրանք կարող է մեկ օր պետք գտն		
<input type="checkbox"/> միանշանակ այո	118	40.8%
<input type="checkbox"/> հավանաբար այն	92	31.8%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	5	1.7%
<input type="checkbox"/> հավանաբար ոչ	57	19.7%
<input type="checkbox"/> միանշանակ ոչ	17	5.9%
9. Արդյոք ինքներդ կնախընտրեիք գնել հակամանրէային դեղեր առանց դեղատոմսի		

<input type="checkbox"/> միանշանակ այս	62	21.5%
<input type="checkbox"/> հավանաբար այս	77	26.6%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	19	6.6%
<input type="checkbox"/> հավանաբար ոչ	121	41.9%
<input type="checkbox"/> միանշանակ ոչ	10	3.5%
10. Ձեր կարծիքով հակամանրէային դեղերը պետք է նշանակվեն՝		
<input type="checkbox"/> միայն բժշկի կողմից	163	56.4%
<input type="checkbox"/> դեղագետն իրավունք ունի խորհուրդ տալու հակաբիոտիկ որոշ բացահայտ դեպքերում	74	25.6%
<input type="checkbox"/> բժիշկն ու դեղագետը հավասարազոր են խորհուրդ տալու հակաբիոտիկներ	49	17.0%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	3	1.0%

Այսուակ 2-ից երևում է, որ հարցվողները քիչ դեպքերում են դրսնորում ճիշտ վերաբերմունք հակամանրէային դեղերի վերաբերյալ, հատկապես՝ հակավիրուսային և հակասնկային միջոցների: Մասնավորապես.

Հարցվողների գրեթե $\frac{1}{4}$ -ը կարծում է, թե հակամանրէային դեղերի ավելորդ կիրառումը Հայաստանում լուրջ խնդիր չի հանդիսանում:

Հարցվողների միայն 37%-ն է համարում, որ հակամանրէային դեղերը պետք է վաճառվեն միայն դեղատոմսով: Ընդ որում հիմնականում դա վերաբերում է հակաբիոտիկներին, այն ինչ հակավիրուսային, հակասնկային և հակամակարուծային դեղերի դեղատոմսային վաճառքի կողմնակից է հարցվողների միայն 12-20%-ը: Միաժամանակ հարցվողների միայն 80%-ն են հակամանրէային դեղերի սրվակային դեղաձևերի դեղատոմսային վաճառքին, այն ինչ ներքին ընդունման (հաբեր և օշարակներ («սրոռ»)) դեղաձևերի դեպքում՝ միայն 41%-ը, աչքի և ականջի կաթիլների դեպքում՝ 28%-ը, իսկ սփրեյերի դեպքում՝ միայն 9%-ը:

Հարկ է նաև նշել, որ հարցվողների 48%-ն ինքները կնախընտրեին գնել հակամանրէային դեղերն առանց դեղատոմսի:

Հարցվողների միայն 32%-ն է մինչև վերջ ավարտում հակաբիոտիկի նշանակված կուրսը:

Հարցվողների 73%-ը նախընտրում են տանը միշտ ունենալ հակամանրէային դեղերի պաշար:

Ցավոր՝ հարցվողների միայն 56%-ն է գիտակցում, որ հակամանրէային դեղերը պետք է նշանակվեն միայն բժշկի կողմից:

Դ. Պրակտիկայի գնահատման հարցերին ստացվել են հետևյալ պատասխաններ.

Աղյուսակ 3.

1. Պատկերացրեք, որ հաճախորդը եկել է Ձեր դեղատուն և խնդրում է ընդամենը 3 դեղահատ ամոքսիկավ: Ինչպե՞ս եք վարկում.		
<input type="checkbox"/> պատահում է, որ ես վաճառում եմ, խորհուրդ տալով, թե ինչպես օգտագործել հակաբիոտիկները	188	65.1%
<input type="checkbox"/> պատահում է, որ ես չեմ տալիս, զգուշացնելով հետևանքների մասին	48	16.6%
<input type="checkbox"/> այդպես չի լինում, սակայն ես խորհուրդ կտայի, թե ինչպես օգտագործել հակաբիոտիկները	38	13.1%
<input type="checkbox"/> այդպես չի լինում, սակայն ես ոչինչ չէի ասի հետևանքների մասին	0	0.0%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	15	5.2%
2. Պացիենտը եկել է Ձեր դեղատուն, որպեսզի վերադարձնի վերջին բուժումից հետո մնացած հակաբիոտիկի դեղահատերը՝		
<input type="checkbox"/> Պատահել է, բայց ես հետ չեմ ընդունել	127	43.9%
<input type="checkbox"/> Պատահել է և ես դրանք հետ եմ ընդունել	14	4.8%
<input type="checkbox"/> Պատահել է և ես դրանք հետ եմ ընդունել՝ միայն եթե գնվել են մեր դեղատանը	19	6.6%
<input type="checkbox"/> Չի եղել, իսկ լինելու դեպքում ես հետ չէի ընդունի	114	39.4%
<input type="checkbox"/> Չի եղել, իսկ լինելու դեպքում ես հետ կընդունեի	2	0.7%
<input type="checkbox"/> Չի եղել, իսկ լինելու դեպքում ես հետ կընդունեի՝ միայն եթե գնվել են մեր դեղատանը	5	1.7%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	8	2.8%
3. Արդյո՞ք հաճախորդին խորհուրդ կտաք հակաբիոտիկ՝ անհայտ (վիրուսային թե բակտերիայի) սուր շնչառական վարակի դեպքում, եթե նա նշի, որ.		
1) Նախորդ անգամ նույն ախտանշաների առկայության ժամանակ նրա վիճակը լավացել է հակաբիոտիկները նշանակումից հետո՝		
<input type="checkbox"/> միանշանակ այն	154	53.3%
<input type="checkbox"/> հավանաբար այն	86	29.8%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	15	5.2%
<input type="checkbox"/> հավանաբար ոչ	28	9.7%
<input type="checkbox"/> միանշանակ ոչ	6	2.1%
2) Մրսածության նշաններն արդեն 3-4 օրից ավել են՝		
<input type="checkbox"/> միանշանակ այն	99	34.3%
<input type="checkbox"/> հավանաբար այն	120	41.5%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	22	7.6%
<input type="checkbox"/> հավանաբար ոչ	37	12.8%
<input type="checkbox"/> միանշանակ ոչ	11	3.8%
3) Իազ՝ դեղին կամ կանաչ խորխով՝		
<input type="checkbox"/> միանշանակ այն	75	26.0%
<input type="checkbox"/> հավանաբար այն	103	35.6%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	23	8.0%
<input type="checkbox"/> հավանաբար ոչ	70	24.2%
<input type="checkbox"/> միանշանակ ոչ	18	6.2%
4) Թարախային արտադրություն քթից՝		
<input type="checkbox"/> միանշանակ այն	71	24.6%
<input type="checkbox"/> հավանաբար այն	95	32.9%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	20	6.9%
<input type="checkbox"/> հավանաբար ոչ	77	26.6%
<input type="checkbox"/> միանշանակ ոչ	26	9.0%

4. Արդյո՞ք հաճախորդին խորհուրդ կտաք հակաբիոտիկ՝ անհայտ (վիրուսային թե բակտերիալ) աղիքային վարակի դեպքում, եթե նա նշի, որ		
1) նախորդ անգամ նույն ախտանշանների առկայության ժամանակ նրա վիճակը լավացել է հակաբիոտիկների նշանակումից հետո՝		
<input type="checkbox"/> միանշանակ այն	147	50.9%
<input type="checkbox"/> հավանաբար այն	99	34.3%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	10	3.5%
<input type="checkbox"/> հավանաբար ոչ	29	10.0%
<input type="checkbox"/> միանշանակ ոչ	4	1.4%
2) առկա են փորի սպաստիկ ցավեր՝		
<input type="checkbox"/> միանշանակ այն	162	56.1%
<input type="checkbox"/> հավանաբար այն	89	30.8%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	12	4.2%
<input type="checkbox"/> հավանաբար ոչ	26	9.0%
<input type="checkbox"/> միանշանակ ոչ	0	0.0%
3) կղանքում առկա են արյան հետքեր՝		
<input type="checkbox"/> միանշանակ այն	145	50.2%
<input type="checkbox"/> հավանաբար այն	94	32.5%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	19	6.6%
<input type="checkbox"/> հավանաբար ոչ	24	8.3%
<input type="checkbox"/> միանշանակ ոչ	7	2.4%
4) առկա է բարձր ջերմություն՝		
<input type="checkbox"/> միանշանակ այն	92	31.8%
<input type="checkbox"/> հավանաբար այն	97	33.6%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	20	6.9%
<input type="checkbox"/> հավանաբար ոչ	61	21.1%
<input type="checkbox"/> միանշանակ ոչ	19	6.6%
5) լուծը տևում է 3-4 օրից ավել՝		
<input type="checkbox"/> միանշանակ այն	98	33.9%
<input type="checkbox"/> հավանաբար այն	97	33.6%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	21	7.3%
<input type="checkbox"/> հավանաբար ոչ	55	19.0%
<input type="checkbox"/> միանշանակ ոչ	18	6.2%
5. Արդյոք հաճախորդից պահանջում եք դեղատոռմ հակամանրէային դեղերի համար՝		
<input type="checkbox"/> միշտ	48	16.6%
<input type="checkbox"/> հաճախ	123	42.6%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	10	3.5%
<input type="checkbox"/> երբեմն	80	27.7%
<input type="checkbox"/> երբեք	28	9.7%
6. Որքա՞ն հաճախ եք խորհուրդ տալիս հակաբիոտիկներ.		
1) սուր շնչառական վիրուսային հիվանդության ժամանակ.		
<input type="checkbox"/> միշտ	179	61.9%
<input type="checkbox"/> հաճախ	80	27.7%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	16	5.5%
<input type="checkbox"/> երբեմն	12	4.2%
<input type="checkbox"/> երբեք	2	0.7%
2) սուր բրոնխիտի ժամանակ.		

<input type="checkbox"/> միշտ	138	47.8%
<input type="checkbox"/> հաճախ	91	31.5%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	21	7.3%
<input type="checkbox"/> երբեմն	33	11.4%
<input type="checkbox"/> երբեք	6	2.1%
3) 3 օրից ավել հազի դեպքում.		
<input type="checkbox"/> միշտ	166	57.4%
<input type="checkbox"/> հաճախ	81	28.0%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	14	4.8%
<input type="checkbox"/> երբեմն	25	8.7%
<input type="checkbox"/> երբեք	3	1.0%
4) 7 օրից ավել հազի դեպքում.		
<input type="checkbox"/> միշտ	141	48.8%
<input type="checkbox"/> հաճախ	83	28.7%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	18	6.2%
<input type="checkbox"/> երբեմն	27	9.3%
<input type="checkbox"/> երբեք	20	6.9%
5) անհայտ ծագման բաձր ջերմության դեպքում.		
<input type="checkbox"/> միշտ	148	51.2%
<input type="checkbox"/> հաճախ	74	25.6%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	23	8.0%
<input type="checkbox"/> երբեմն	22	7.6%
<input type="checkbox"/> երբեք	22	7.6%
7. Արդյո՞ք միշտ ուղղորդում եք հիվանդներին, թե ինչպես պատշաճ կիրառել հակամանրէային դեղերը.		
<input type="checkbox"/> միշտ	11	3.8%
<input type="checkbox"/> հաճախ	104	36.0%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	2	0.7%
<input type="checkbox"/> երբեմն	81	28.0%
<input type="checkbox"/> երբեք	91	31.5%
8. Արդյոք միշտ զգուշացնում եք հակամանրէային դեղերի ոչ պատշաճ կիրառման հետևանքների մասին՝		
<input type="checkbox"/> միշտ	9	3.1%
<input type="checkbox"/> հաճախ	118	40.8%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	3	1.0%
<input type="checkbox"/> երբեմն	78	27.0%
<input type="checkbox"/> երբեք	81	28.0%
9. Արդյո՞ք խորհուրդ եք տալիս հակասնկային դեղեր հակաբիոտիկների կիրառման ժամանակ՝		
<input type="checkbox"/> միշտ	26	9.0%
<input type="checkbox"/> հաճախ	164	56.7%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	8	2.8%
<input type="checkbox"/> երբեմն	63	21.8%
<input type="checkbox"/> երբեք	28	9.7%

Այսուակ 3-ից երևում է, որ գիտելիքները պրակտիկայիում ճիշտ են կիրառվում միայն 4.9-59.2% դեպքերում: Մասնավորապես.

Հակաբիոտիկի ոչ լիարժեց կուրս գնելու դեպքում դեղատան աշխատակիցների 18%-ը որևէ խորհուրդ կամ նախազգուշացում հետևանքների մասին չեն տալիս: Ընդհանրապես, հակամանրէային դեղերի ճիտ կիրառման վերաբերյալ հաճախորդներին իրազեկում են հարցվողների միայն 40%-ը, իսկ ոչ պատշաճ հետևանքների մասին՝ միայն 44%-ը:

Բուժման կուրսից հետո մնացած հակամանրէային դեղերի հետ ընդունումը չեն բացառել հարցվողների 14%-ը:

Տարբեր սիմպտոմատիկայի նկարագրության դեպքում հարցվողների 65-87%-ը խորհուրդ կտային հակամանրէային դեղեր, այն ինչ ավելի ճիշտ կլիներ ուղղորդել բժշկին:

Ցավալի է, սակայն սուր շնչառական վիրուսային հիվանդության ժամանակ հարցվողների 90%-ը խորհուրդ են տալիս հակաբիոտիկներ:

Հակաբիոտիկների կիրառման ժամանակ հակասնկային դեղերի անհիմն խորհուրդ է տալիս հարցվողների 66%-ը:

Ե. Լրացուցիչ հարցերին ստացվել են հետևյալ պատասխաններ.

Այլուսակ 4.

1. Արդյոք ստանում եք ժամանակակից տեղեկատվություն հակամանրէային դեղերի վերաբերյալ (ցուցումներ, դոզաներ, հիվանդների նախընտրությունները) ¹		
<input type="checkbox"/> այո	279	96.5%
<input type="checkbox"/> ոչ	4	1.4%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	6	2.1%
2. Եթե այո, ապա որտեղից եք ստանում ժամանակակից տեղեկատվություն հակամանրէային դեղերի վերաբերյալ.		
<input type="checkbox"/> կլինիկական պրոտոկոլներ (ուղեցույցներ)	71	24.6%
<input type="checkbox"/> դասագրքեր	72	24.9%
<input type="checkbox"/> դեղագործական տեղեկատուներ («справочник»)	148	51.2%
<input type="checkbox"/> համացանց (ինտերնետ)	193	66.8%
<input type="checkbox"/> դեղագործական ընկերությունների ուսումնական նյութեր	155	53.6%
<input type="checkbox"/> գործընկերների խորհուրդներ	62	21.5%
<input type="checkbox"/> դժվարանում եմ պատասխանել	1	0.3%

Այլուսակ 4-ից երևում է, որ հարցվողների մեծամասնությունը ստանում է ժամանակակից տեղեկատվություն հակամանրէային դեղերի վերաբերյալ: Ընդ որում, հաճախակի օգտագործվող աղբյուրներն են՝ համացանցը, դեղագործական ընկերությունների ուսումնական նյութերն ու դեղագործական տեղեկատուները: Միաժամանակ կլինիկական ուղեցույցերին և դասագրքերին դիմում է հարցվողների միայն քարորդ մասը:

Եզրակացություն.

Վերլուծության արդյունքները ցուցադրեցին գիտելիքների, վերաբերմունքի և պրակտիկայում դրանց կիրառման ընդամենը միջին արդյունք: Մատնանշական է, որ հատկապես ցածր արդյունքներ են դիտվում հակավիրուսային և հակասնկային դեղերի պարագայում:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը, անհրաժեշտ է.

- Մշակել ուսումնական դասընթացներ դեղատների աշխատակիցների համար, նվիրված հակամանրէային կայունության զարգացման պատճառներին և դրա կանխարգելմանը,
- Ուսումնական հաստատությունների դասավանդող անձնակազմի ուշադրությունը դարձնել հակամանրէային տարբեր խմբերի, հատկապես՝ հակավիրուսային և հակասնկային դեղերի վրա,
- Վերապատրաստման դասընթացների ժամանակ ավելի շատ ժամանակ հատկացնել հակավիրուսային և հակասնկային դեղերի ցուցումներին,
- Հատուկ ուշադրություն դարձնել հակամանսէային դեղերի բոլոր խմբերի նկատմամբ կայունության զարգացման պատճառների և դրա կանխմանն ուղղված միջոցառումների վրա,
- Ամենուրեք բացատրել, որ հակամանրէային դեղերը՝ անկախ հանգամանքներից, պետք է նշանակվեն միայն բժշկի կողմից,
- Ուժեղացնել հսկողությունը վերահսկող կառույցների կողմից հակամանրէային դեղերի բաց թողնման կանոնների ապահովման ուղղությամբ: